

休薬が望ましい薬 (出血リスクの高い手術などの場合)

【例】内視鏡（ポリペクトミー）、術後出血への対応が困難な手術、大手術

(注：検査・手術によって休薬期間が異なります)

2剤以上併用時は慎重に対応

出血リスク高い薬剤

創傷治癒遅延

※1日の目安
最終内服より24時間経過していればよい

当院採用薬(2021.6現在)

分類	一般名	商品名		※休薬期間目安
抗血小板薬	アスピリン	アスピリン	バイアスピリン	アスピリン腸溶錠
	アスピリン・ダイアルミニウム配合錠	バファリン配合錠A81・330 ニトギス配合錠A81	アスファネート配合錠A81 バツサミン配合錠A81	ファミター配合錠A81 イスキア配合錠A330
	アスピリン・ランソプラゾール配合錠	タケルダ配合錠		
	アスピリン・ホノブラザンフマル酸塩配合錠	キャブピリン配合錠		
	チクロピジン塩酸塩	パナルジン	チクロピジン塩酸塩	
	クロピドグレル硫酸塩	クロピドグレル	ブラビックス	
	アスピリン・クロピドグレル配合錠	コンブラピン配合錠	ロレアス配合錠	
	プラスグレル	エフィエント		
	チカグレロル	ブリリント		
	シロスタゾール	シロスタゾール	ブレタール	シロスレット
	サルボグレラート塩酸塩	サルボグレラート	アンブラーグ	
	イコサペント酸エチル	イコサペント酸エチル	エパデール	エパロース
	ω-3脂肪酸エステル	ロトリガ粒状カプセル		
抗凝固薬	ワルファリンカリウム	ワーファリン	ワルファリン	3～5日 (ヘパリン置換)
	ダビガトラン	プラザキサ		Ccr50>:2日 Ccr50≤:4日 (ヘパリン置換)
	リバーロキサバン	イグザレルト		1日
	アピキサバン	エリキユース		2日 (ヘパリン置換)
	エドキサバン	リクシアナ		1日
グラブロン製剤	リマプロストアルファデクス	リマプロストアルファデクス	オパルモン	プロレナール
	ベラプロストナトリウム	ドルナー	プロサイリン	ケアロードLA
冠血管拡張薬	ジピリダモール	ジピリダモール	ベルサンテン	2日
	ジラゼブ塩酸塩	コメリアンコーワ	ジラゼブ塩酸塩	1日
	トラピジル	ロコルナール	トラピジル	1日
脳循環改善薬	イブジラスト	ケタス		3日
	ニセルゴリン	サアミオン	ニセルゴリン	2～3日
	イフェンプロジル酒石酸塩	セロクラール	イフェンプロジル酒石酸塩	2日
抗癌薬	ベバシズマブ	アバステン	ベバシズマブ	症例に応じて 28日～42日
	レンパチニブメシル酸塩	レンピマ		7日

・抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン2012、追補2017
・心房細動治療(薬物)ガイドライン2013 改訂版
・NCCNガイドライン(直腸癌) Version 3.2017
・循環器疾患における抗凝固・抗血小板療法に関するガイドライン
・脳卒中治療ガイドライン2015
・適正使用ガイド
・周術期管理チームテキスト 第3版
・添付文書

2014年 8月26日改訂
2016年 4月26日改訂
2019年 11月27日改訂
2021年 6月28日改訂

* 内視鏡検査、白内障手術、抜歯、術後出血の対応が容易な手術は、休薬期間目安なし