

## 【大腸癌レジメン】

レジメン番号	1201300110	1クール:14日	
レジメン名	FOLFOX4		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1、2
3	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート100mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1、2
4	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
5	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1、2
6	5%ブドウ糖500mL+フルオロウラシル600mg/m <sup>2</sup>	CV・22時間	day1、2
7	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201300200	1クール:14日	
レジメン名	FOLFOX6		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1
3	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
4	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
5	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1
6	生食+フルオロウラシル2400mg/m <sup>2</sup> (インフューザーポンプ使用)	CV・46時間	day1
7	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201300310	1クール:14日	
レジメン名	FOLFIRI		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1、2
3	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
4	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	CV・1時間30分	day1
5	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1
6	5%ブドウ糖500mL+フルオロウラシル1200mg/m <sup>2</sup>	CV・23時間	day1、2
7	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201300400	1クール:14日	
レジメン名	FOLFIRI(外来)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1
3	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
4	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	CV・1時間30分	day1
5	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1
6	生食+フルオロウラシル2400mg/m <sup>2</sup> (インフューザーポンプ使用)	CV・46時間	day1
7	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201300520	1クール:14日	
レジメン名	BV+FOLFOX4		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1、2
3	生食100mL+ベパシズマブ5mg/kg	CV・1時間30分	day1
4	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート100mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1、2
5	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1

6	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1、2
7	5%ブドウ糖500mL+フルオロウラシル600mg/m <sup>2</sup>	CV・22時間	day1、2
8	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201300610	1クール:14日	
レジメン名	BV+FOLFOX6		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1
3	生食100mL+ベバシズマブ5mg/kg	CV・1時間30分	day1
4	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
5	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
6	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1
7	生食+フルオロウラシル2400mg/m <sup>2</sup> (インフューザーポンプ使用)	CV・46時間	day1
8	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201300720	1クール:14日	
レジメン名	BV+FOLFIRI		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1、2
3	生食100mL+ベバシズマブ5mg/kg	CV・1時間30分	day1
4	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
5	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	CV・1時間30分	day1
6	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1
7	5%ブドウ糖500mL+フルオロウラシル1200mg/m <sup>2</sup>	CV・23時間	day1、2
8	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201300810	1クール:14日	
レジメン名	BV+FOLFIRI(外来)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1
3	生食100mL+ベバシズマブ5mg/kg	CV・1時間30分	day1
4	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
5	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	CV・1時間30分	day1
6	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1
7	生食+フルオロウラシル2400mg/m <sup>2</sup> (インフューザーポンプ使用)	CV・46時間	day1
8	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201300904	1クール:21日	
レジメン名	BV+XELOX		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	5%ブドウ糖250mL	div・4時間30分	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1
3	生食100mL+ベバシズマブ7.5mg/kg	div(側)・1時間30分	day1
4	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン130mg/m <sup>2</sup>	div(側)・2時間	day1
5	ゼローダ(2400mg~4200mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	1201300905	1クール:21日	
レジメン名	BV+SOX		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	5%ブドウ糖250mL	div・4時間30分	day1

2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1
3	生食100mL+ベバシズマブ7.5mg/kg	div(側)・1時間30分	day1
4	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン130mg/m <sup>2</sup>	div(側)・2時間	day1
5	エスワンタイホウ(80mg~120mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	1201300906	1クール:28日	
レジメン名	BV+IRIS		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・4時間	day1、15
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1、15
3	生食100mL+ベバシズマブ5mg/kg	div(側)・1時間30分	day1、15
4	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン100mg/m <sup>2</sup>	div(側)・1時間30分	day1、15
5	エスワンタイホウ(80mg~120mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	1201300907	1クール:21日	
レジメン名	BV+XELIRI		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・4時間	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1
3	生食100mL+ベバシズマブ7.5mg/kg	div(側)・1時間30分	day1
4	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	div(側)・1時間30分	day1
5	ゼローダ(1800mg~3600mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	1201300922	1クール:28日	
レジメン名	BV+ロンサーフ		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL	div・15分	day1、15
2	生食100mL+ベバシズマブ5mg/kg	div・1時間30分	day1、15
3	生食50mL	div・15分	day1、15
4	ロンサーフ(30mg~150mg/日) 5日間服用2日間休薬を2回繰り返す。その後、14日休薬する。		

レジメン番号	1201300930	1クール:14日	
レジメン名	サイラムザ+FOLFIRI(外来)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg+ポララミン5mg	CV・30分	day1
3	生食250mL+サイラムザ8mg/kg	CV・1時間	day1
4	生食50mL	CV・15分	day1
5	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
6	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	CV・1時間30分	day1
7	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1
8	生食+フルオロウラシル2400mg/m <sup>2</sup> (インフューザーポンプ使用)	CV・46時間	day1
9	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201300940	1クール:14日	
レジメン名	サイラムザ+FOLFIRI		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg+ポララミン5mg	CV・30分	day1
3	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day2
4	生食250mL+サイラムザ8mg/kg	CV・1時間	day1

5	生食50mL	CV・30分	day1
6	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
7	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	CV・1時間30分	day1
8	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1
9	5%ブドウ糖500mL+フルオロウラシル1200mg/m <sup>2</sup>	CV・23時間	day1、2
10	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201300950	1クール:14日	
レジメン名	ザルトラップ+FOLFIRI(外来)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1
3	生食100mL+ザルトラップ4mg/kg	CV・1時間	day1
4	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
5	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	CV・1時間30分	day1
6	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1
7	生食+フルオロウラシル2400mg/m <sup>2</sup> (インフューザーポンプ使用)	CV・46時間	day1
8	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201300960	1クール:14日	
レジメン名	ザルトラップ+FOLFIRI		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1、2
3	生食100mL+ザルトラップ4mg/kg	CV・1時間	day1
4	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
5	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	CV・1時間30分	day1
6	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1
7	5%ブドウ糖500mL+フルオロウラシル1200mg/m <sup>2</sup>	CV・23時間	day1、2
8	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201301010	1クール:14日	
レジメン名	ベクティビックス+FOLFOX4		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1、2
3	生食50mL	CV・10分	day1
4	生食100mL+ベクティビックス6mg/kg	CV・1時間	day1
5	生食50mL	CV・30分	day1
6	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート100mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1、2
7	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
8	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1、2
9	5%ブドウ糖500mL+フルオロウラシル600mg/m <sup>2</sup>	CV・22時間	day1、2
10	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201301100	1クール:14日	
レジメン名	ベクティビックス+FOLFOX6		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mgバッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1
3	生食50mL	CV・10分	day1
4	生食100mL+ベクティビックス6mg/kg	CV・1時間	day1
5	生食50mL	CV・30分	day1
6	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
7	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1

8	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1
9	生食+フルオロウラシル2400mg/m <sup>2</sup> (インフューザーポンプ使用)	CV・46時間	day1
10	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201301210	1クール:14日	
レジメン名	ベクティビックス+FOLFIRI		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1、2
3	生食50mL	CV・10分	day1
4	生食100mL+ベクティビックス6mg/kg	CV・1時間	day1
5	生食50mL	CV・30分	day1
6	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
7	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	CV・1時間30分	day1
8	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1
9	5%ブドウ糖500mL+フルオロウラシル1200mg/m <sup>2</sup>	CV・23時間	day1、2
10	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201301300	1クール:14日	
レジメン名	ベクティビックス+FOLFIRI(外来)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1
3	生食50mL	CV・10分	day1
4	生食100mL+ベクティビックス6mg/kg	CV・1時間	day1
5	生食50mL	CV・30分	day1
6	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
7	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	CV・1時間30分	day1
8	5%ブドウ糖50mL+フルオロウラシル400mg/m <sup>2</sup>	CV・全開	day1
9	生食+フルオロウラシル2400mg/m <sup>2</sup> (インフューザーポンプ使用)	CV・46時間	day1
10	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201301400	1クール:14日	
レジメン名	ベクティビックス単独		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL	div・10分	day1
2	生食100mL+ベクティビックス6mg/kg	div・1時間	day1
3	生食50mL	div・30分	day1

レジメン番号	1201301410	1クール:28日	
レジメン名	ベクティビックス+IRIS		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・3時間30分	day1、15
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1、15
3	生食100mL+ベクティビックス6mg/kg	div(側)・1時間	day1、15
4	生食250mL+イリノテカン100mg/m <sup>2</sup>	div(側)・1時間30分	day1、15
5	エスワンタイホウ(80mg~120mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	1201301500	1クール:42日	
レジメン名	アービタックス+CPT-11(A法)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食100mL+ポララミン5mg	div・30分	day1、8、15、22、29、36
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート3.3mg	div・30分	day1、8、15、22、29、36

3	生食250mL+アービタックス250mg/m <sup>2</sup>	div・1時間	day1、8、15、22、29、36
	生食500mL+アービタックス400mg/m <sup>2</sup> (初回のみ)	div・2時間	day1(初回のみ)
4	生食100mL	div・1時間	day1、8、15、22、29、36
5	生食500mL+イリノテカン100mg/m <sup>2</sup>	div・1時間30分	day1、8、15、22
6	生食100mL	div・30分	day1、8、15、22

レジメン番号	1201302000	1クール:49日	
レジメン名	アービタックス+CPT-11(B法)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食100mL+ポララミン5mg	div・30分	day1、8、15、22、29、36、43
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート3.3mg	div・30分	day1、8、15、22、29、36、43
3	生食250mL+アービタックス250mg/m <sup>2</sup>	div・1時間	day1、8、15、22、29、36、43
	生食500mL+アービタックス400mg/m <sup>2</sup> (初回のみ)	div・2時間	day1(初回のみ)
4	生食100mL	div・1時間	day1、8、15、22、29、36、43
5	生食500mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	div・1時間30分	day1、15、29
6	生食100mL	div・30分	day1、15、29

レジメン番号	1201302500	1クール:7日	
レジメン名	アービタックス単独		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食100mL+ポララミン5mg	div・30分	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート3.3mg	div・30分	day1
3	生食250mL+アービタックス250mg/m <sup>2</sup>	div・1時間	day1
	生食500mL+アービタックス400mg/m <sup>2</sup> (初回のみ)	div・2時間	day1(初回のみ)
4	生食100mL	div・1時間	day1

レジメン番号	1201302610	1クール:21日	
レジメン名	アービタックス+SOX		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg+ポララミン5mg	div・30分	day1
2	生食100mL+デキサート3.3mg+ポララミン5mg	div・30分	day8、15
3	生食250mL+アービタックス250mg/m <sup>2</sup>	div・1時間	day1、8、15
	生食250mL+アービタックス400mg/m <sup>2</sup> (初回のみ)	div・2時間	day1(初回のみ)
4	生食100mL	div・1時間	day1、8、15
5	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン130mg/m <sup>2</sup>	div・2時間	day1
6	生食50mL	div・全開	day1
7	エスワンタイホウ(80mg~120mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	1201303330	1クール:21日	
レジメン名	XELOX		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	5%ブドウ糖100mL	div・3時間	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1
3	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン130mg/m <sup>2</sup>	div(側)・2時間	day1
4	ゼローダ(2400mg~4200mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	1201303340	1クール:21日	
レジメン名	SOX		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	5%ブドウ糖100mL	div・3時間	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1
3	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン130mg/m <sup>2</sup>	div(側)・2時間	day1

4	エスワンタイホウ(80mg~120mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14
---	------------------------	-----------	---------

レジメン番号	1201303350	1クール:28日	
レジメン名	IRIS		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食100mL	div・2時間30分	day1、15
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1、15
3	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン125mg/m <sup>2</sup>	div(側)・1時間30分	day1、15
4	エスワンタイホウ(80mg~120mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	1201303360	1クール:21日	
レジメン名	XELIRI		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食100mL	div・2時間30分	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div(側)・30分	day1
3	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	div(側)・1時間30分	day1
4	ゼローダ(1800mg~3600mg/日)	p.o・朝・夕食後	day1-14

レジメン番号	1201303400	1クール:14日	
レジメン名	FOLFOXIRI		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	CV・30分	day1
3	生食100mL+デキサート6.6mg	CV・30分	day2
4	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	CV・1時間	day1
5	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
6	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
7	5%ブドウ糖500mL+フルオロウラシル1500mg/m <sup>2</sup>	CV・22時間	day1、2
8	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201303410	1クール:14日	
レジメン名	FOLFOXIRI(外来)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	CV・30分	day1
3	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	CV・1時間	day1
4	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
5	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
6	生食+フルオロウラシル3000mg/m <sup>2</sup> (インフューザーポンプ使用)	CV・46時間	day1
7	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201303420	1クール:14日	
レジメン名	FOLFOXIRI維持療法		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg+デキサート6.6mg	CV・30分	day1、2
3	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
4	5%ブドウ糖500mL+フルオロウラシル1500mg/m <sup>2</sup>	CV・22時間	day1、2
5	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201303430	1クール:14日	
レジメン名	FOLFOXIRI維持療法(外来)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日

1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1
3	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
4	生食+フルオロウラシル3000mg/m <sup>2</sup> (インフューザーポンプ使用)	CV・46時間	day1
5	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201303441	1クール:14日	
レジメン名	BV+FOLFOXIRI		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	CV・30分	day1
3	生食100mL+デキサート6.6mg	CV・30分	day2
4	生食100mL+ペバシズマブ5mg/kg	CV・1時間30分	day1
5	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	CV・1時間	day1
6	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
7	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
8	5%ブドウ糖500mL+フルオロウラシル1500mg/m <sup>2</sup>	CV・22時間	day1、2
9	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201303451	1クール:14日	
レジメン名	BV+FOLFOXIRI(外来)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	CV・30分	day1
3	生食100mL+ペバシズマブ5mg/kg	CV・1時間30分	day1
4	5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m <sup>2</sup>	CV・1時間	day1
5	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
6	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン85mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
7	生食+フルオロウラシル3000mg/m <sup>2</sup> (インフューザーポンプ使用)	CV・46時間	day1
8	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201303461	1クール:14日	
レジメン名	BV+FOLFOXIRI維持療法		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1、2
3	生食100mL+ペバシズマブ5mg/kg	CV・30分	day1
4	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
5	5%ブドウ糖500mL+フルオロウラシル1500mg/m <sup>2</sup>	CV・22時間	day1、2
6	ヘパロック		day3

レジメン番号	1201303471	1クール:14日	
レジメン名	BV+FOLFOXIRI維持療法(外来)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食10mL(ポート穿刺、開通確認用)		day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	CV・30分	day1
3	生食100mL+ペバシズマブ5mg/kg	CV・30分	day1
4	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m <sup>2</sup>	CV・2時間	day1
5	生食+フルオロウラシル3000mg/m <sup>2</sup> (インフューザーポンプ使用)	CV・46時間	day1
6	ヘパロック		day3